

梨の防除暦（露地、有袋栽培）

平成30年度

月	旬	生育栽培管理 防除時	病害虫防除		注意事項
			必行防除	応急防除	
1	上 中 下				
2	上 中 下	整枝せん定			
3	上 中 下	発芽期	① 黒星病、赤星病 デラン(F) 1,000倍		
4	上	りんぼう脱落期 芽かぎ 摘らい	② 黒星病、赤星病 アブラムシ、ハマキムシ アンビル(F) 2,000倍 サイアノックス(水) 1,000倍		○シンクイムシ多発圃ではコンフューザーNを10a当たり200本程度設置する。 ○スコアは収穫14日前まで。
	中 下	新高開花人工授粉 幸水開花人工授粉	③ 黒星病、輪紋病 ハマキムシ・ケムシ類 キノドー(F) 1,000倍 サムコル(F) 5,000倍	アブラムシ ウララ(DF) 2,000倍 シンクイムシ ハマキムシ コンフューザーN 200本/10a	
5	上	結実	⑤ 黒星病、赤星病 アフエット(F) 2,000倍		○トレノックスは収穫30日前まで。 ○サイアノックスは有袋は収穫7日まで、無袋は収穫45日前まで。 ○フェニックスは収穫前日まで。
	中	摘果	⑥ 黒星病、赤星病 ハマキムシ、シンクイムシ クワコナカイガラムシ トレノックス(F) 500倍 サイアノックス(水) 1,000倍	※カイガラムシ多発ほ場 カイガラムシ類 アブラムシ コルト(顆水) 4,000倍	
	下		⑦ 黒星病、赤星病 アブラムシ、ハマキムシ、カメムシ シンクイムシ、ハダニ アフエット(F) 2,000倍 ロディー(水) 1,000倍		
6	上	袋掛け	⑨ 黒星病、輪紋病 アブラムシ、コナカイガラムシ類 カメムシ ストロビー(DF) 3,000倍 アドマイヤー(顆水) 10,000倍		○ダーズバンは使用時期が収穫21日前から30日前に変更。
	中		⑩ 黒星病、輪紋病 ハダニ類 キノドー(F) 1,000倍 バロック(F) 2,000倍		
	下	新梢誘引	⑫ 黒星病、輪紋病 アブラムシ類、カイガラムシ類若齢幼虫 ハマキムシ類、シンクイムシ類 キノドー(F) 1,000倍 ダイアジノン(水)34 1,000倍		
7	上	新梢伸長停止	⑬ 黒星病、輪紋病 アブラムシ、シンクイムシ コナカイガラムシ類、ケムシ オキシラン(水) 500倍 スタークル(顆溶) 2,000倍	ハダニ類 マイトコーネ(F) 1,500倍	○マイトコーネは収穫前日まで。
	中		⑭ 黒星病、輪紋病 ハダニ類 ベルクート(F) 1,500倍 コロマイト(水) 2,000倍		○ロディーは収穫前日まで。
	下		⑮ 黒星病、輪紋病 シンクイムシ、ハマキムシ、ケムシ類 キノドー(F) 1,000倍 サムコル(F)10 5,000倍	カメムシ類、ハダニ類 アブラムシ類、シンクイムシ類 ロディー(水) 1,000倍	
8	上 中 下	幸水収穫	⑯ 黒星病、輪紋病 ハダニ類 ストロビー(DF) 3,000倍 ダニサラバ(F) 2,000倍	ハマキムシ類、シンクイムシ類 フェニックス(F) 4,000倍	○フェニックスは収穫前日まで。
9	上 中 下	豊水収穫			
10	上 中 下	新高収穫 基肥施用 土づくり	⑰ 豊水収穫後 黒星病、輪紋病 シンクイムシ、カイガラムシ類 カメムシ オキシラン(水) 500倍 スプラサイド(水) 1,500倍		○スプラサイド無袋は収穫21日前、有袋は7日前まで。
11	上 中 下	落葉期			
12	上 中 下				

農薬名の略号

(水)：水和剤、(乳)：乳剤、(液)：液剤、(溶)：水溶剤、(顆溶)：顆粒水溶剤、(顆水)：顆粒水和剤、(F)：フロアブル剤、(DF)：ドライフロアブル剤

※ 収穫前日数は、24時間を1日としてカウントします。農薬使用の際は、農薬のラベルを必ず確認して使用してください。

※ 不明な点は、JA又は普及指導センターまでお問い合わせください。

※ 同一枠内の農薬は混用試験例・事例はありますが、混用を薦めるものではなく、また結果を保証するものではありません。

※ 気象条件・生育段階等により、薬害が発生する場合がありますので、散布の際はご注意ください。

※ 農薬使用後は、必ず日誌を記帳し、出荷前に提出してください。